



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

Oficiul Fitosanitar Vrancea
Str. Milcov, Nr.40, Focșani,
Jud. Vrancea

Telefon/fax 0237210164
E-mail:ofvrancea@anfof.ro
Nr. 19 din 05.05.2022

BULETIN AVERTIZARE NR 16

Condițiile climatice sunt favorabile dezvoltarea dăunătorului la LUCERNĂ gărgăriță (HYPERA VARIABILIS). Gărgărița are o generație pe an, apare în prima decadă a lunii mai. Adultii rod frunzele, larvele sunt miniere și prin hrănire atacă vârful de creștere. La atac puternic cultura are aspect de arsură.

Pentru combatere recomandăm următoarele produse de protecție a plantelor:

- KARATE ZEON 0,15 l / ha pentru lucerna sămânță sau,
- FASTER 10 CE -0,1 l/ha sau,
- DELMUR -500m l/ha.

Puteți utiliza și alte produse de protecția plantelor cuprinse în baza de date PEST – EXPERT de pe site-ul M.A.D.R. (www.madr.ro). Important : folosirea adjuvantilor la oricare tratament cu produse ppp de contact sau sistemic efectuat, permite acoperirea rapidă a suprafetelor tratate și influențează pozitiv alipirea soluției pe plante, asigură rezistență la spălarea de către ploi , contribuind în acest fel la creșterea considerabilă a eficacității tratamentelor fitosanitare.

Alte recomandări:

- tratamentele fitosanitare se vor efectua pe vreme liniștită sau la viteze ale vântului cuprinse între 0,5-3 m/sec. La viteze ale vantului mai mari de 3 m/sec. nu se vor efectua tratamente fitosanitare.
- cititi cu atenție toate instrucțiunile de pe eticheta produsului;
- utilizati responsabil toate produsele fitosanitare;
- nu trătiți langa cursurile de apă ,santuri și alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
- folosiți numai aparate de stropit în stare perfectă de funcționare , bine reglate și calibrate;
- clătiți de trei ori ambalajele în care au fost ppp și turnați apă de clătire în cuva;
- aplicați pe parcele tratata restul de soluție din cuva , diluata cu apă de clătire;
- spălați aparatele de stropit după fiecare tratament;
- nu deversați apele reziduale langa cursurile de apă , locuinte.

ATENTIE!!!!

Având în vedere că sezonul apicol se află în plină activitate, se impune necesitatea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

Respectați cu strictețe perioadele de remanență a produselor de protecție a plantelor, a normelor de lucru, de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor, conform Protocolului de Colaborare nr.3242/F/21.10.2016 dintre MADR-ANF și ROMAPIS, Ordinul comun Nr.45/1991/127/68/15B/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociația Crescătorilor de Albine din ROMÂNIA , Ministerul Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administrație locală, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și Legea nr. 280/2015 privind modificarea legii apiculturii.

Pentru prevenirea intoxicațiilor la albine, deținătorii de suprafețe agricole și silvice (fermieri/producători agricoli) sunt obligați să anunțe în scris consiliile locale / primăriile cu cel puțin 48 ore înainte de efectuarea tratamentului, locul, data, durată tratamentului, denumirea produsului folosit , metoda de aplicare(prăfuire,stropire,aerosoli). Consiliile locale, precum și administratorii terenurilor agricole sau silvice trebuie să anunțe în scris sau telefonic apicultorii care au vatră sau stupină staționară/permanent sau temporară /pastorală cu cel puțin 24 ore înainte de efectuarea de către deținătorii de suprafețe agricole sau silvice (fermieri / producători agricoli), a tratamentelor cu ppp, în vederea prevenirii intoxicațiilor la albine.

Şef serviciu,
Ing.
Neață Împăratu Ioana

Întocmit
Ing.Şerban Valentina